

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。—

注意事項等情報改訂のお知らせ

2023 年 7 月

製造販売元
日本ケミファ株式会社
東京都千代田区岩本町2丁目2-3

販売元
日本薬品工業株式会社
東京都千代田区岩本町2丁目2-3

HMG-CoA還元酵素阻害剤

日本薬局方 アトルバスタチンカルシウム錠

処方箋医薬品

アトルバスタチン錠5mg「ケミファ」

アトルバスタチン錠10mg「ケミファ」

Atorvastatin

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび令和5年7月20日付 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知及び自主改訂に基づき、標記製品の注意事項等情報の記載内容を改訂致しましたので、ご案内申し上げます。

製品のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

< 1. 改訂内容（2023年7月改訂） >（該当部分のみ抜粋）

【1】「慎重投与」の項の記載を一部改訂し、以下のように改めました。

下線部：追記箇所（薬生安通知）

改訂後	改訂前
1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） (1)～(6)省略、変更なし (7)重症筋無力症又はその既往歴のある患者 [重症筋無力症（眼筋型、全身型）が悪化又は再発することがある。]	1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） (1)～(6)省略

【2】「副作用」の「重大な副作用」の項の記載を一部改訂し、以下のように改めました。

下線部：追記箇所（薬生安通知）

改訂後	改訂前
4. 副作用 (1)重大な副作用（頻度不明） 1)～8)省略、変更なし 9)重症筋無力症：重症筋無力症（眼筋型、全身型）が発症又は悪化することがあるので、 観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	4. 副作用 (1)重大な副作用（頻度不明） 1)～8)省略

◇次頁以降もご覧ください

【3】「相互作用」の「併用注意」の項の記載を一部改訂し、以下のように改めました。

下線____部：追記箇所（自主改訂）、下線____部：削除箇所

改訂後			改訂前		
3. 相互作用			3. 相互作用		
(2) 併用注意（併用に注意すること）			(2) 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
省略、変更なし			省略		
HIVプロテアーゼ阻害剤 ロピナビル・リトナビル 等	ロピナビル・リトナビルとの併用により本剤のAUCが5.88倍に上昇するとの報告がある。	機序：これらの薬剤によるCYP3A4の阻害が考えられている。	HIVプロテアーゼ阻害剤 ロピナビル・リトナビル メシル酸 ネルフィナビル 等	ロピナビル・リトナビルとの併用により本剤のAUCが5.88倍、 <u>メシル酸ネルフィナビル</u> との併用により本剤のAUCが約1.7倍に上昇するとの報告がある。	機序：これらの薬剤によるCYP3A4の阻害が考えられている。
ニルマトレルビル・リトナビル	併用により本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。本剤の副作用が発現しやすくなるおそれがあるため、十分な観察を行いながら慎重に投与し、必要に応じて減量や休薬等の適切な措置を講ずること。	機序：本剤の代謝を競合的に阻害するためと考えられている。	以下省略		
エンシトレルビル フマル酸	併用により本剤の血中濃度が上昇し、副作用が発現しやすくなるおそれがある。	機序：エンシトレルビル フマル酸のCYP3A に対する阻害作用が考えられている。	(本剤：アトルバスタチン製剤)		
以下省略、変更なし					
(本剤：アトルバスタチン製剤)					

< 2. 改訂理由 >

【1】 1. 慎重投与 (7) 及び 【2】 4. 副作用 (1) 重大な副作用 [薬生安通知]

医薬品医療機器総合機構（以下、「機構」）により、HMG-CoA 還元酵素阻害剤（以下、「スタチン」）の電子添文に重症筋無力症に関する注意喚起を追加することが適切と判断されたことから、「慎重投与」及び「重大な副作用」の項の記載を改訂しました。

2023 年 2 月、スタチン及び配合剤に対し、欧州添付文書に重症筋無力症、眼筋無力症を追記する欧州医薬品庁のファーマコビジランス・リスク評価委員会（PRAC）勧告がなされました。これを受け、専門委員の意見も踏まえた調査の結果、以下の点から機構は電子添文の記載を変更することが適切と判断しました。

- ・国内副作用症例において、スタチンと重症筋無力症の因果関係が否定できない症例が認められていること。
- ・公表文献において、スタチンの再投与で重症筋無力症の症状が再発した症例、スタチンの中止で重症筋無力症の症状が消失した症例等、スタチンと重症筋無力症との因果関係が否定できない症例が報告されていること。
- ・公表文献において、WHO 個別症例安全性報告グローバルデータベース (VigiBase) において不均衡分析を行い、スタチンの重症筋無力症に関する副作用報告数がデータベース全体から予測される値より統計学的に有意に高かったとの報告があること。また、機構で実施した VigiBase の 2023 年 5 月 23 日時点のデータセットを用いた不均衡分析においても、同様の結果が示されたこと。
- ・国内外のガイドラインで、重症筋無力症において注意を要する薬剤としてスタチンが記載されていること。

【3】 3. 相互作用 (2) 併用注意 [自主改訂]

先発製剤の改訂に基づき、相互作用相手薬の記載と整合性をとるため、「併用注意」の項に「ニルマトレルビル・リトナビル」と「エンシトレルビル フマル酸」を追記しました。

また、「メシル酸ネルフィナビル」の記載を販売中止（経過措置期間の満了）のため削除しました。

以上

●今回の改訂内容につきましては医薬品安全対策情報 (DSU) No.319 (2023 年 8 月発行) に掲載される予定です。

●最新の電子添文は独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページの「医薬品に関する情報 (<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)」及び弊社ホームページの「医療関係者向けサイト (<https://www.npi-inc.co.jp/medical/products>)」に掲載されます。

また、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ[®]」で下記 GS1 コードを読み取ることによりご覧いただくこともできます。

